

Hygienekonzept für Test-to-Go-Stellen Berlin

Erstellt von: Senat Berlin

Datum: 07.03.2021

Version: v1

Einleitung

Im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie sind in Abhängigkeit von der epidemiologischen Situation in allen Test-to-Go-Stellen zusätzliche, über die Basishygiene hinausgehende Maßnahmen erforderlich, um das Risiko der Verbreitung des Erregers durch unerkannt Infizierte einzudämmen.

Maßnahmen der Basishygiene

In der Teststation sind folgende Maßnahmen zu beachten:

- Mindestabstand einhalten (1,5 m), soweit dies möglich ist
- kein Zutritt der Stelle bei Erkältungssymptomen des Mitarbeiters
- Proband hat FFP2 zu tragen
- Kein Händeschütteln oder Umarmen, Verzicht auf Körperkontakt
- mit den Händen nicht das Gesicht berühren
- Husten- und Niesetikette beachten (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Händewaschen	<ul style="list-style-type: none"> – vor Arbeitsbeginn, – nach Arbeitsende – nach Toilettengang – nach sichtbarer Verschmutzung (ohne Infektionsgefahr) 	<ul style="list-style-type: none"> – Flüssiges Handwaschpräparat aus dem Spender entnehmen, – gründlich waschen, – abspülen – Mit Einmalhandtuch aus dem Spender trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> – Handelsübliche Flüssigseife aus Spender – Verwendung von Einmalflaschen – Einmalhandtuch
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> – vor Beginn der Probennahme – Bei Handschuhwechsel – Nach jedem Ablegen der Handschuhe 	<ul style="list-style-type: none"> – Ca. 3 - 5 ml Desinfektionsmittel in die trockenen Hände, bzw. auf Handschuhe reiben – auf Fingerspitzen, Nagelfalz und Daumen achten – über die gesamte Einwirkzeit feucht halten – Anbruchdatum auf Gebinde notieren – 30 Sekunden Einwirkzeit (EWZ) einhalten 	Produkt: <ul style="list-style-type: none"> – VAH-gelistetes Händedesinfektionsmittel, z.B. Sterilium
	<ul style="list-style-type: none"> – bei sichtbarer Kontamination der Hände/Handschuhe 	<ul style="list-style-type: none"> – Verunreinigung mit Händedesinfektionsmittel getränktem Papierhandtuch o.ä. entfernen. – Danach Händedesinfektion. – Nach EWZ ggf. Hände waschen – Bei starker Verschmutzung Hände vorsichtig abspülen, waschen und anschließend desinfizieren 	<ul style="list-style-type: none"> – Hautdesinfektionsmittel – Einmalhandtuch
Hautpflege	<ul style="list-style-type: none"> – Zu Arbeitsbeginn – nach dem Händewaschen – zwischendurch und am Arbeitsende 	<ul style="list-style-type: none"> – Hautpflegemittel in die Haut einmassieren 	<ul style="list-style-type: none"> – Med. Hautpflegeprodukt
Hautschutz	<ul style="list-style-type: none"> – bei Bedarf – vor längerem Tragen von Handschuhen 	<ul style="list-style-type: none"> – Hautschutzmittel aus Spender oder Tube in die Haut einmassieren 	<ul style="list-style-type: none"> – Med. Hautschutzprodukt
Medizinische Einmalhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> – Beim Nehmen der Abstriche – Bei Kontaktmöglichkeiten zu potenziell infektiösem Material 	<ul style="list-style-type: none"> – Nur auf trockene Hände und nicht länger als nötig tragen. – Nach jedem physischen Kontakt mit einem Probanden wechseln und entsorgen. – Bei Probennahme: Desinfektion der Handschuhe zwischen den Abstrichen (max. 5 Probanden oder alle 30 Min.) – Wechsel bei Beschädigung oder Feuchtigkeit innen 	<ul style="list-style-type: none"> – Medizinische Einmalhandschuhe (z.B. Nitrilhandschuhe) – Eignung für Umgang mit infektiösem Material muss vorhanden sein
Schutzhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> – Reinigungsarbeiten – Flächendesinfektion 	<ul style="list-style-type: none"> – Maximale Expositionszeit bei Anwendung von Chemikalien beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Chemikalienbeständige Handschuhe.
Schutzkittel, Gesichtsschild, Mund-Nasen-Schutz	<ul style="list-style-type: none"> – Beim Nehmen der Abstriche – bei Gefahr des Verspritzens von potenziell infektiösem Material – FFP2 in allen Bereichen 	<ul style="list-style-type: none"> – Fachgerecht anlegen (an Teststation ablegen) – Bei Abstrichnehmern sind Schmuck und Uhren abzulegen (gilt für alle Bereiche). – Vor dem Betreten des Pausenraums ist die Schutzausrüstung (am Ort des Abstrichs) abzulegen und die Hände zu desinfizieren – Für das An- und Ablegen der Schutzkleidung sind die Schwarz/Weiß-Bereiche zu nutzen. 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesichtsschild – Schutzkittel oder -anzug sind erlaubt. – FFP2 in den Abstrichbereichen, bei Tätigkeiten im Aufenthaltsraum und Lagerraum

WAS	WANN	WIE	WOMIT
Schuhwerk, Kleidung	<ul style="list-style-type: none"> - Beim Nehmen der Abstriche - bei Gefahr des Verspritzens von potenziell infektiösem Material 	<ul style="list-style-type: none"> - Fachgerecht anlegen - Bei starker Verschmutzung Schuhe vorsichtig abspülen, waschen und anschließend desinfizieren - Kleidung ist täglich zu wechseln 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschlossenes Schuhwerk - Lange Hosen
Spender- aufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienhebel: täglich - Gehäuse: bei sichtbarer Verschmutzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Wischdesinfektion 	<ul style="list-style-type: none"> - VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel
	<ul style="list-style-type: none"> - alle Spender: halbjährlich 	<ul style="list-style-type: none"> - Steigrohr mit Einmalhandtuch abwischen, - Dosierpumpe unter fließendem Wasser reinigen, - Reinigung des Spendergehäuses unter fließend heißem Wasser, - Trocknen - Wischdesinfizieren von Spendergehäuse, Rückwand und Dosierpumpe. 	<ul style="list-style-type: none"> - VAH- gelistetes Flächendesinfektions-mittel
Untersuchung			
Arbeitsflächen, Tabletts, Tischablagefläche	<ul style="list-style-type: none"> - vor Benutzung - nach Benutzung - alle 2h über 24h Laufzeit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sichtbare Verunreinigungen mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch entfernen und desinfizieren. - Wischdesinfektion mit einem Oberflächenverträglichen Produkt 	<ul style="list-style-type: none"> - VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel
Probandenzugängliche Bereiche des Zentrums: High touch points wie Türklinken, Fenstergriffe, Dokumentenablagen, Laptops, PC Tastaturen, PC Mäuse, Böden, Wände	<ul style="list-style-type: none"> - Je nach Frequentierung des Zentrums alle 2 Stunden - Hardware alle 2h mit Desinfektion - Wände 1x/24h - Böden 1x / 24h. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sichtbare Verunreinigungen mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch entfernen und desinfizieren. - Wischdesinfektion mit einem oberflächenverträglichen Produkt 	<ul style="list-style-type: none"> - VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel - Durch Abstrichnehmende im Abstrichbereich
Sonstige Gerätschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Bereiche mit Hautkontakt nach Benutzung - Bei Kontamination sofort 	<ul style="list-style-type: none"> - Wischdesinfektion mit oberflächenverträglichem Präparat. - Sichtbare Verunreinigungen mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch entfernen und desinfizieren 	<ul style="list-style-type: none"> - VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel
	<ul style="list-style-type: none"> - Gehäuse 2x täglich 		<ul style="list-style-type: none"> - VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel
Abfälle zur Entsorgung z.B.: benutzte Handschuhe, MNS, etc.	<ul style="list-style-type: none"> - bei Anfall 	<ul style="list-style-type: none"> - Abwurf in geeignete Behältnisse, mit Deckel verschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> - In reißfeste „Biohazard-Müllsäcke“, Entsorgung in normalem Restmüll.

Hinweis: Das mit der Reinigung und Desinfektion betraute Personal muss geeignet, unterwiesen und eingewiesen sein.

Personalhygiene und Testkonzept:

Alle Mitarbeiter sollten an jedem Arbeitstag getestet werden.

Tägliche Symptomabfrage bei allen Mitarbeitern vor Betreten der Teststation und Arbeitsbeginn.
Schriftliches Festhalten der Symptome, Temperatur und Namen der Mitarbeiter.

Umgebungshygiene

Es ist darauf zu achten, dass alle Räume regelmäßig belüftet sind.

Auch die Laptops und weitere Geräte sowie Materialien sollen wie im Hygieneplan beschrieben gereinigt werden.

Alle Flächen müssen nach Beendigung einer täglichen Testreihe final desinfiziert werden.

Der Abstrichbereich ist während des Betriebs nur vom Abstrichpersonal zu betreten. Ausnahmen hierzu sind nur für besondere Zwecke für Teamleiter möglich.

Jegliches anderes Personal betritt den Abstrichbereich nicht. Personal, welches Abstriche durchführt, verlässt die Abstrichräume nicht, außer für Pausen und bei Dienstende (nach Entledigung des Schutzmaterials).

Hygiene bei Testpersonen

Alle Testpersonen sind angehalten eine FFP2-Maske während der gesamten Testphase zu tragen. Dieser soll nur für den eigentlichen Abstrich abgenommen werden. Falls Testpersonen keinen MNS-Schutz besitzen, werden MNS-Masken von uns ausgegeben.

Zudem eine Händedesinfektion vor Betreten der Test-Station.

Regeln:

Was passiert, wenn eine Testperson den Mund-Nasen-Schutz abnimmt?

Die jeweilige Person muss den Testbereich sofort verlassen. Falls es offensichtlich zu Verunreinigungen gekommen ist, muss dieser Bereich sofort desinfiziert und ggfs. Material entsorgt werden.

Was passiert mit einer Testperson die offensichtlich Symptome hat welche denen von Covid19 ähnlich sind?

Alle sonst auch durchgeführten Maßnahmen werden durchgeführt.

Was passiert mit einer Testperson die bekannt gibt, dass sie aktuell positiv auf Covid19 getestet wurde?

Diese müssen im Falle eines Selbsttests oder Schnelltest in die vom Senat Berlin vorgesehenen PCR-Testzentren geschickt werden. Terminvergabe hierfür online möglich.

Was passiert wenn ein bereits genutztes Testkit kontaminiert wird?

Dieser Test darf nicht mehr genutzt werden! Er muss gesondert verworfen werden. Eine Notiz muss an den Store Manager erfolgen.

Was passiert wenn ein Mitarbeiter/Personal Krankheitssymptome zeigt?

Es gelten die von der Gesundheitsbehörde bereitgestellten Maßnahmen.

[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.pdf? blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.pdf?blob=publicationFile)